



農薬の使用基準を遵守し、他作物への飛散防止に注意して使用しましょう。

適期収穫を行いましょう。

Table with columns for month (4-8) and sub-columns for growth stages (田植, 活着期, etc.). Includes main tasks like 'ガス抜き' and '中干し'.

J A 米基準

- 農産物検査の受検 ○栽培履歴の記帳と提出 ○ふるい目 1.85mm
○種子更新率 100% ○仕上げ水分 14.5%

収穫適期 (黄褐色率70~80%)

・黄褐色率が70%程度になれば収穫適期となり、遅くとも80%程度までには収穫する。
・籾の水分含量は28~24%程度である。



適期

Table with columns for month (5-10) and sub-columns for growth stages. Includes main tasks like 'ガス抜き' and '中干し'.

★高温対策★

○適期移植 (平坦部での早植えは品質が低下)
○水管理の徹底
○適期収穫

除草剤

Table with columns: 除草剤名, 使用量, 使用時期, 留意事項. Lists various herbicides and their application details.

(中期除草剤) ホタルイ、広葉雑草、ノビエが残った場合

Table with columns: 雑草条件, 除草剤名, 使用量, 使用時期, 留意事項. Details for late-stage weed control.

Table with columns for month (5-10) and sub-columns for growth stages. Includes main tasks like 'ガス抜き' and '中干し'.

Table with columns for month (5-10) and sub-columns for growth stages. Includes main tasks like 'ガス抜き' and '中干し'.

土づくり

- 1. 堆肥の施用による土づくりを行いましょう。堆肥 2t/10a。
2. ケイ酸質土壌改良資材を施用しましょう。

Table with columns: 資材名, 施用量 (10a当たり). Lists fertilizer and soil amendment materials.

※ケイ酸質資材を施用すると稲体が硬くなり、病害虫・倒伏に強くなります。また、登熟が良くなり、食味が向上します。

塩水選

Table with columns: 比重, 食塩, 硫酸, 備考. Details for salt water selection process.

施肥基準

Table with columns: 品種, 地域区分, 肥料名, 全層施肥, 側条施肥, 1回目, 2回目. Fertilization standards for different varieties and regions.

- 1. 大豆後で妻を作付していない場合は、基肥を通常の半分とする。
2. レンゲをすき込んだ場合は、原則基肥は施肥しない(レンゲが田面の8割以上生えている場合)。

基肥一発肥料

Table with columns: 品種, 全層施肥, 側条施肥, 備考. Details for one-time basal fertilizer application.

※基肥一発肥料を使用する場合は、早く施肥して乾田状態で置いておくと、速効性肥料分の肥効が低下し、緩効性肥料の窒素溶出が早くなるため、できるだけ田植え近く(1週間以内)に施用しましょう。

育苗期の消毒・防除(苗立ち枯れ・いもち対策)

Table with columns: 農薬名, 適用病害, 使用量, 使用時期. Details for seedling disinfection and pest control.

種子消毒

Table with columns: 薬液の構成, 使用量, 処理方法. Details for seed disinfection process.

スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)対策

Table with columns: 農薬名, 使用量, 備考. Details for slug/snail control.

基本防除体系

※箱施薬剤を施用する際は、除草剤と間違わないように袋の確認をしましょう。

○箱施薬剤 (10a当たり)

Table with columns: 農薬名, 施用時期, 施用量, 対象病害虫, 備考. Details for box-applied pesticides.

○粉剤 (10a当たり)

Table with columns: 農薬名, 施用時期, 施用量, 対象病害虫, 備考. Details for powder pesticides.

○液剤 (60~150ℓ/10a当たり)

Table with columns: 農薬名, 施用時期, 施用量, 対象病害虫, 備考. Details for liquid pesticides.

注) 蜜蜂への危害防止のため、開花期を外して防除してください。

目安: ウンカ類は適時発生に応じて。カメムシ類は穂揃い期7~10日後の穂が垂れ始めた頃。

○粒剤 (散布に当たっては、田水深を3cm以上にし、散布後少なくとも3~4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水しない。)

Table with columns: 農薬名, 施用時期, 施用量, 対象病害虫, 備考. Details for granular pesticides.