

適期収穫を行いましょう。

農薬の使用基準を遵守し、他作物への飛散防止に注意して使用しましょう。


Table with columns for variety (品種), month (月旬), and growth stages (生育). Includes irrigation (水管理) and main tasks (主な作業) for varieties like 夢つくし and ヒノヒカリ.

J A 米基準

- 農産物検査の受検 ○栽培履歴の記帳と提出 ○ふるい目 1.85mm
○種子更新率 100% ○仕上げ水分 14.5%

収穫適期 (黄褐色粉70~80%)

・黄褐色粉が70%程度になれば収穫適期となり、遅くとも80%程度までには収穫する。
・粉の水分含量は28~24%程度である。



適期

Table with columns for variety (品種), month (月旬), and growth stages (生育). Includes irrigation (水管理) and main tasks (主な作業) for varieties like 夢つくし and ヒノヒカリ.

★高温対策★

○適期移植 (平坦部での早植えは品質が低下)
○水管理の徹底
○適期収穫

除草剤

Table listing herbicides (除草剤名), usage (使用量), application timing (使用時期), and precautions (留意事項).

(中期中除草剤) ホタルイ、広葉雑草、ノビエ等が残った場合

Table listing herbicides for specific weeds (対象雑草), usage (使用量), application timing (使用時期), and precautions (留意事項).

Table with columns for variety (品種), month (月旬), and growth stages (生育). Includes irrigation (水管理) and main tasks (主な作業) for varieties like 夢つくし and ヒノヒカリ.

Table with columns for variety (品種), month (月旬), and growth stages (生育). Includes irrigation (水管理) and main tasks (主な作業) for varieties like 夢つくし and ヒノヒカリ.

土づくり

- 1. 堆肥の施用による土づくりを行いましょう。堆肥 2t/10a。
2. ケイ酸質土壌改良資材を施用しましょう。

Table listing soil improvement materials (資材名) and their application rates (施用量).

※ケイ酸質資材を施用すると稲が硬くなり、病虫害・倒伏に強くなります。また、登熟が良くなり、食味が向上します。

塩水選

比重液の作り方

Table showing the ratio of water to salt/sulfur for creating a density liquid (比重液).

施肥基準

Table detailing fertilizer standards (施肥基準) for different varieties and regions, including base fertilizer (基肥) and topdressing (穂肥).

- 1. 大豆後で麦を作付していない場合は、基肥を通常の半分とする。
2. レンゲをすき込んだ場合は、原則基肥は施肥しない(レンゲが田面の8割以上生えている場合)。

基肥一発肥料

Table listing one-time base fertilizer (基肥一発肥料) for different varieties and regions.

※基肥一発肥料を使用する場合は、早く施肥して乾田状態で置いておくと、速効性肥料分の肥効が低下し、緩効性肥料の窒素溶出が早くなるため、できるだけ田植え近く(1週間以内)に施用しましょう。

育苗期の消毒・防除 (苗立ち枯れ・いもち対策)

Table listing disinfection and control measures for seedling stage, including agent names and usage.

種子消毒

Table detailing seed disinfection (種子消毒) procedures, including agent names and usage.

スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)対策

Table detailing control measures for the freshwater snail (スクミリンゴガイ).

基本防除体系

※箱施薬剤を施用する際は、除草剤と間違わないように袋の確認をしましょう。

○箱施薬剤

Table listing box-applied pesticides (箱施薬剤) and their usage.

○粉剤

Table listing powder pesticides (粉剤) and their usage.

○液剤

Table listing liquid pesticides (液剤) and their usage.

注) 蜜蜂への危害防止のため、開花期を外して防除してください。
目安: ウンカ類は適時発生に応じて。
カメムシ類は穂揃い期7~10日後の穂が垂れ始めた頃。

○粒剤

Table listing granular pesticides (粒剤) and their usage.